

## KARAKTERISTIKA VED ULCERØS KOLITT

### SYMPTOMER

- Blod i avføringen
- Diaré
- Smarter
- Feber
- Vekttap
- Rask puls
- Generell sykdomsfølelse

### UTBREDELSE

- Sykdommen rammer nærmest utelukkende tykktarmen.

### ENDOSKOPI

#### (KIKKERTUNDERSØKELSE: KOLOSKOPI ELLER SIGMOIDEOSKOPI )

(se kap. 1.7)

- Endetarmen er nesten alltid involvert.
- Inflammasjonen er sammenhengende i hele det angrepne området av tykktarmen.
- Tarmslimhinnen er rød, hoven og blør ofte.

### MIKROSKOPI AV VEVSPRØVER

- Overfladisk inflammasjon.
- Det er for mange betennelsesceller, hvite blodlegemer i tarmslimhinnen.

### SYMPTOMER UTENFOR TARMEN

- *Ledd*: Artritt (leddbetennelse),

med hovne og ømme ledd, f.eks. knær, hofter og ankler. Leddsymptomene følger vanligvis betennelsesaktiviteten i tarmen. Artralgi (leddsmerter uten hevelse) forekommer svært ofte. Som regel lokalisert i de mindre leddene, f.eks. håndledd og fingerledd, og har vanligvis ingen sammenheng med symptomene fra tarmsykdommen.

- *Hud*: Erythema nodosum (knuterosen, røde, ømme knuter i huden). Viser seg ved røde, ømme knuter i huden, oftest på underarmene eller på framsiden av leggen. Pyoderma gangrenosum er en langt mer uvanlig tilstand, med dype sår i huden. Ses oftest ved aktiv tarmsykdom.
- *Øyne*: Uveitt (regnbuehinnebetennelse) ses spesielt ved aktiv tarmsykdom. Viser seg ved røde og smertefulle øyne, spesielt ved sterkt lys.
- *Lever*: Hos noen få pasienter kan det oppstå en betennelsestilstand i gallegangene som kan føre til forsnevring og eventuelt gulsott (primær skleroserende kolangitt). Denne tilstanden er helt uavhengig av aktiviteten i tarmsykdommen.